



《伤寒论》速记背诵思维导图


1、太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。



2、太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。




3、太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。




4、伤寒一日，太阳受之，脉若静者，为不传；颇欲吐，若躁烦，脉数急者，为传也。

伤寒论第4条




5、伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。

伤寒论第5条




6、太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病。若发汗已，身灼热者，名风温。风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，鼻息必鼾，语言难出。若被下者，小便不利，直视失溲。若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘵疢，若火熏之。一逆尚引日，再逆促命期。


伤寒论第6条




7、病有发热恶寒者，发于阳也；无热恶寒者，发于阴也。
发于阳，七日愈；发于阴，六日愈。以阳数七，阴数六故也。




8、太阳病，头痛至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。




9、太阳病，欲解时，从巳至未上。




10、风家，表解而不了了者，十二日愈。




11、病人身大热，反欲得衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。




12、太阳中风，阳浮而阴弱，阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出，啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣干呕者，《桂枝汤》主之。



13、太阳病，头痛发热，汗出恶风者，《桂枝汤》主之。




14、太阳病，项背强几几，反汗出恶风者，《桂枝加葛根汤》主之。




15、太阳病，下之后，其气上冲者，可与《桂枝汤》，方用前法。若不上冲者，不得与之。

伤寒论第15条




16、太阳病三日，已发汗，若吐、若下、若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与之也。观其脉症，知犯何逆，随证治之。桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。


伤寒论第16条




17、若酒客病，不可与《桂枝汤》，得之则呕，以酒客不喜甘故也。




18、喘家，作《桂枝汤》，加厚朴、杏子佳。




19、凡服《桂枝汤》吐者，其后必吐脓血也。




20、太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，《桂枝加附子汤》主之。




21、太阳病,下之后,脉促,胸满者,《桂枝去芍药汤》主之。




22、若微寒者,《桂枝去芍药加附子汤》主之。




23、太阳病，得之八九日，如疟状，发热恶寒，热多寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发，脉微缓者，为欲愈也。脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗、更下、更吐也。面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜《桂枝麻黄各半汤》。




24、太阳病，初服《桂枝汤》，反烦不解者，先刺风池、风府，却与《桂枝汤》则愈。




25、服《桂枝汤》，大汗出，脉洪大者，与《桂枝汤》如前法。若形似疟，一日再发者，汗出必解，宜《桂枝二麻黄一汤》。




26、服《桂枝汤》，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，《白虎加人参汤》主之。



27、太阳病，发热恶寒，热多寒少，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜《桂枝二越婢一汤》。




28、服《桂枝汤》，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，《桂枝去桂加茯苓白术汤》主之。



29、伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急，反与桂枝欲攻其表，此误也；得之便厥，咽中干，烦躁，吐逆者，作《甘草干姜汤》与之，以复其阳；若厥愈足温者，更作《芍药甘草汤》与之，其脚即伸；若胃气不和，谵语者，少与《调胃承气汤》；若重发汗，复加烧针者，《四逆汤》主

之。




30、问曰：证象阳旦，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，两胫拘急而谵语。师曰：言夜半手足当温，两脚当伸。后如师言，何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚。风则生微热，虚则两胫挛。病形象桂枝，因加附子参其间，增桂令汗出。附子温经，亡阳故也。厥逆，咽中干，烦躁，阳明内结，谵语烦乱，更饮《甘草干姜汤》，夜半阳气还，两足当热；胫尚微拘急，重与《芍药甘草汤》，尔乃胫伸；以《承气汤》微溏，则止其谵语，故知病可愈。


辨太阳病脉证并治中

合六十六法，方三十九首，并见太阳阳明合病法。


31、太阳病，项背强几几，无汗恶风，《葛根汤》主之。




32、太阳与阳明合病者，必自下利，《葛根汤》主之。




33、太阳与阳明合病，不下利，但呕者，《葛根加半夏汤》主之。



34、太阳病，桂枝证，医反下之，利遂不止，脉促者，表未解也，喘而汗出者，《葛根黄芩黄连汤》主之。



35、太阳病，头痛发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘者，《麻黄汤》主之。



36、太阳与阳明合病，喘而胸满者，不可下，宜《麻黄汤》。

